


2. Aşağıda gösterilen hava hareketlerinden hangisi yağış getirmez?



4. Sıcak ve soğuk karakterli hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

- A) Yağış B) Yüksek basınç
C) Şiddetli rüzgâr D) Yüksek sıcaklık
E) Don olayı

5. Bir yerde yağışın başlaması, aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?

- A) Rüzgârın şiddetlenmesinin
B) Sıcaklığın günlük ortalamasının üstüne çıktığının
C) Hava basıncında ani yükselme olduğunun
D) Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin
E) Bulut seviyesinin alçalacağıının

(1988-ÖSS)

6. Bir yerde güneş enerjisinden yararlanma olanağı güneşli gün sayısı ve güneşlenme süresine bağlı olarak değişir.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerden hangisinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı en azdır?

- A) Doğu Karadeniz kıyıları
B) Çukurova
C) Ege Bölgesi kıyıları
D) Konya Ovası
E) Harran Ovası

7.



Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde bağıl nemin en az olması beklenir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(1994-ÖSSS)

10.




Yukarıda esiş yönü ve ortamı gösterilen rüzgârlardan hangilerinin yağış getirmesi beklenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

(1997-ÖSS)

11. Buharlaşma miktarı sıcaklıkla doğru, bağıl nemle ters orantılıdır. Aşağıdaki grafikte beş merkezlin sıcaklıkları ve bağıl nem oranları gösterilmiştir.



Yukarıdaki bilgilere göre, bu merkezlerden hangisinde buharlaşma miktarının en az olması beklenir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


(1998-ÖSS)

12. Bir bölgedeki yağış düzeninde meydana gelecek uzun süreli değişiklik, o bölgede aşağıdakilerin hangisini etkilemez?

- A) Tarım ürünleri çeşitliliği B) Jeolojik yapı
C) Doğal bitki örtüsü D) Mera hayvancılığı
E) Erozyon şiddeti

(1999-ÖSS)

13. Bağıl nem, belli bir sıcaklıkta havada mevcut su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranıdır. Aşağıdaki grafik, belli bir yerde beş farklı sıcaklıkta havada mevcut su buharı ile havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarlarını (gr/m^3) göstermektedir.




Yukarıdaki bilgilere göre, kaç °C sıcaklıkta havada bağıl nem en düşüktür?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

(2000-ÖSS)

14. Aşağıdaki haritada, Türkiye'de yıllık güneşlenme sürelerinin dağılışı gösterilmiştir.



Bu haritadaki bilgilerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

- A) Akdeniz Bölgesinin kıyı kesiminde güneşlenme süresi 3000 saatten fazladır.
B) Ege Bölgesinin kuzey ve güney kesimindeki güneşlenme süreleri arasındaki fark, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey ve güneyi arasındaki farktan azdır.
C) Marmara Bölgesinde güneşlenme süreleri ortalaması, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ortalamadan azdır.
D) Kıyı kesimleri boyunca güneşlenme süreleri birbirine yakındır.
E) Güneşlenme süresi Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe genellikle azalır.

(2001-ÖSS)

15. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma-çözümle olaylarının sıklığı mekanik çözümü hızlandırır.

Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?

- A) Ekvatorial ormanlar
B) Çöller
C) Kutup altı bölgeler
D) Dağların yüksek kesimleri
E) Orta kuşak karaların iç kesimleri

(2002-ÖSS)

16. Belirli bir bölgede yıl boyunca sıcaklık yüksek, sıcaklık farkı az, bulutluluk ve nem oranı fazladır. Bu bilgilere dayanarak, bu bölgeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

- A) Bitki örtüsü gürdür.
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
C) Kimyasal çözümü görülür.
D) Akarsu debileri yüksektir.
E) Yıllık ortalama yağış miktarı fazladır.

(2003-ÖSS)

17. Bir ülkede yer alan X ve Y yörelerinde ormanların bir bölümü yangın nedeniyle tahrip olmuştur. Bu alanlar kendi haline bırakıldığında, X yöresinde orman bir süre sonra kendini yenilemiş, Y yöresinde ise yenileyememiş ve ağaçlandırmaya yapılması gerekmiştir.

Buna göre, X ve Y yöreleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) X yöresinde nem oranı Y yöresinden fazladır.
B) X ve Y yörelerinin enlemleri farklıdır.
C) Y yöresinde akarsu ağı X yöresinden daha sıktır.
D) Y yöresinin ortalama yükseltisi X yöresinden fazladır.
E) X yöresinin yüzölçümü Y yöresinden büyüktür.

(2004-ÖSS)

18. Havadaki nem oranının doyma noktasına erişmiş olması hangi hava olayına yol açar?

- A) Hava basıncının yükselmesine
B) Rüzgârın şiddetlenmesine
C) Sıcaklığın yükselmesine
D) Yağışın başlamasına
E) Bulut seviyesinin yükselmesine

19.



Genellikle yaz aylarında bulut kümelerinin alt yüzü şeklinde olduğu gibi düzdür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olabilir?

- A) Bulutun çok yüksekte olması
B) Hava sıcaklığının çok yüksek olması
C) Buharlaşmanın fazla olması
D) Yoğunlaşmanın aynı seviyede başlaması
E) Havanın rüzgârlı olması

20. Aşağıdakilerden hangisi, havanın taşıyabileceği nem miktarının sıcaklığa göre değiştiğini gösterir?

- A) Denize yakın bölgelerin sıcak olması
- B) Bir yamaçta yükselen havanın yağış bırakması
- C) Ekvator çevresinin yağışlı olması
- D) Güneyden esen rüzgârın hava sıcaklığını arttırması
- E) Bazı bölgelerin yazın yağış alması

21. Aşağıdakilerden hangisi, havadaki bağıl nemin doyma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?

- A) Alçalcı hava hareketlerinin olması
- B) Rüzgâr şiddetinin artması
- C) Atmosferde farklı tipte bulutlar bulunması
- D) Hava sıcaklığının düşmesi
- E) Hava hareketlerinin karadan denize doğru olması

(1992-ÖYS)

22. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin yağış getirmesi beklenir?

- A) Yamaçlardan eteklere doğru esen
- B) Denizden karalara doğru esen
- C) Engebesiz bir oluk içinde esen
- D) Ovalardan denizlere doğru esen
- E) Bir yamacı aşıp diğer yamaçtan aşağıya esen


(1993-ÖYS)

24. Havadaki bağıl nem oranı arttığında aşağıdakilerden hangisi beklenir?

- A) Hava sıcaklığının yükselmesi
- B) Bulutluluğun artması
- C) Alçalcı hava hareketlerinin görülmesi
- D) Don olaylarının meydana gelmesi
- E) Rüzgâr hızının artması

(1995-ÖYS)

25.



Dünya'nın en fazla yağış alan yöresi haritada kaç numara ile gösterilmiştir?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

(1997-ÖYS)

26. Havadaki nemin yoğunlaşmasıyla meydana gelen aşağıdaki maddelerden hangisi yağışla ilgili değildir?

- A) Bulut
- B) Yağmur
- C) Kar
- D) Dolu
- E) Kırağı

27. Güneşli ve rüzgârsız bir günde gökyüzünde bulutların oluştuğu görülse, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

- A) Atmosferde yükselici hava hareketi vardır.
- B) Atmosferin sıcaklığı yer sıcaklığından yüksektir.
- C) Atmosferin mutlak nemi artmıştır.
- D) Atmosferin bağıl nemi düşmüştür.
- E) Atmosferde alçalcı hava hareketi vardır.

(1978-ÜSS)

CEVAPLAR

1. A	2. E	3. C	4. A	5. D	6. A
7. C	8. E	9. E	10. A	11. A	12. B
13. D	14. D	15. A	16. B	17. A	18. D
19. D	20. B	21. D	22. B	23. C	24. B
25. D	26. A	27. A			

Türkiye'de orman yangınları, Batı ve Güney kesimlerine göre Kuzey kesimlerinde çok daha azdır.

Kuzeyde orman yangınlarının az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orman içi yerleşmelerin dağınık olması
- B) Orman alt sınırının kıyıda başlaması
- C) Nem oranının fazla olması
- D) Ormanlarının daha çok yamaçlarda yer alması
- E) Orman içi ulaşım ağının gelişmiş olması

(1991-ÖSS)

Orografik yağışlar, denizden gelen nemli hava kütlelerinin kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarına çarparak yükselmesi sonucu meydana gelir.

Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde yıl içinde orografik yağışların daha fazla görülmesi beklenir?

- A) Ilgaz Dağları'nın güney yamaçlarında
- B) Doğu Karadeniz Dağları'nın güney yamaçlarında
- C) Aydın Dağları'nın kuzey yamaçlarında
- D) Küre Dağları'nın kuzey yamaçlarında
- E) Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında