

1. Kanada'nın bazı bölgelerinde, doğal olarak yetişen ve besleyici değeri çok yüksek şekerli bir öz-sü elde edilen "şeker akçaağacı"nı, Orman Araştırma Enstitüsü Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirmeyi planlamaktadır.
- Bunun için neden Doğu Anadolu bölgesi seçilmiş olabilir?**

- A) Tarımda kullanılmayan geniş alanları olmasından
B) Kanada ile aynı enlemler arasında yer almasından
C) Kanada'dakine benzer iklim özelliklerine sahip olmasından
D) Bu bölgedeki gelir kaynaklarını artırmaya öncelik tanımasından
E) Orman yetiştirmeye elverişli bir bölge olmasından

(1983-ÖSS)

2. Türkiye'de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesini sağlayan başlıca etken nedir?

- A) Yerçekillerinin çeşitliliği
B) Ilıman iklim kuşağında yer alması
C) Denizlerle çevrili olması
D) Geniş topraklara sahip olması
E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

(1983-ÖSS)

3. İç Anadolu'da, bazı yerleşim merkezleri çevresindeki korunmuş alanlarda orman ağaçlarının yetişebilmesi, bu bölgeyle ilgili olarak neyi düşündürür?

- A) Bulunduğu enlemlere göre daha sıcak olduğunu
B) Yıllık yağışlarının düzenli olduğunu
C) Doğal bitki örtüsünün tümüyle gerçek bozkır olmadığını
D) İkliminin karasal olmadığını
E) Ormanın kolayca yetiştirilebileceğini

(1984-ÖSS)

5. Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin yayılış alanına girer. Buna karşın, yurdumuzda birbirinden belirgin farklarla ayrılabilen iklim tipleri görülür. Bu farklılaşmada aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

- A) Yerçekili
B) Denize göre konum
C) Rüzgârların yönü
D) Bölgelerin genişliği
E) Yükselti

(1984-ÖSS)

6. Sıcaklığın yıl içinde dağılışı bakımından birbirine en çok benzeyen kent çifti, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Trabzon - Sivas
B) Zonguldak - Bolu
C) Adana - Diyarbakır
D) Zonguldak - Trabzon
E) Iğdır - Adana

(1984-ÖSS)

7. Yazları ılık, kışları soğuk ve her mevsimi yağışlı geçen bir bölgenin, doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisine uyar?

- A) Savan B) Orman C) Bozkır
D) Tundra E) Maki

(1986-ÖSS)

8.



Yukarıdaki haritada Türkiye'de orman alanlarının dağılışı görülmektedir.

Buna göre orman dağılışını etkileyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akarsu ağı B) Yükselti
C) Erozyon D) Toprak çeşidi
E) Nem oranı

(1987-ÖSS)

9. Akdeniz Bölgesinde yetişen otsu bitkilerden birçoğunun yüzeyi kâdife gibi tüylerle kaplıdır. Bu durum, bitkinin bölge koşullarına uyma çabasının bir sonucudur.

Bitkinin böyle bir özelliğe sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Erozyonun şiddetli olması
B) Yağışın genellikle yağmur olarak düşmesi
C) Yazın buharlaşmanın şiddetli olması
D) Günlük sıcaklık farkının yüksek olması
E) Topraktaki kil oranının fazla olması

(1987-ÖSS)

10. Hava kütesinin sıcaklığı yükseldikçe, taşıyabileceği nem miktarı artar.

Buna göre, Balkanlardan gelerek Türkiye üzerinden Basra Körfezine ulaşan nemli bir hava kütesinin nerede yağış bırakması beklenir, neden?

- A) Edirne ve Kırklareli yöresinde. Çünkü, iki tarafında deniz olduğundan nem fazladır.
B) Bolu ve Kastamonu yöresinde. Çünkü, yükselti arttığından sıcaklık düşer.
C) İç Anadolu Bölgesinde. Çünkü, etrafı dağlarla çevrilidir.
D) Marmara Denizi üzerinde. Çünkü, buharlaşma fazladır.
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde. Çünkü, sıcaklığı yüksektir.

(1987-ÖSS)

12. Aşağıdakilerden hangisi, bu bölgede etkili olan sıcaklık ve yağış rejimi hakkında en çok bilgi verir?

- A) Doğal bitki örtüsü
B) Akarsu ağı
C) Denize yakınlık
D) Yükselti
E) Hâkim rüzgâr yönü

(1989-ÖSS)

13. "Kış erken gelir, çok soğuk olur. Kar ortalama 80 gün toprak üstünde kalır. Yaz da erken gelir, çok sıcak olur; karlar hızla erir."

Yukarıda hangi iklim tipinden söz edilmektedir?

- A) Tropikal B) Akdeniz
C) Orta Kuşak Karasal D) Okyanus
E) Muson

(1989-ÖSS)


17. Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı, araştırma için gittiği yörede kekik, lavanta, zeytin, zakkum ve defne gibi bitkilerin yaygın olduğunu gözlemiştir.

Bu yöredeki bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisine uygundur?

- A) Çayır B) Bozkır C) Tundra
D) Savan E) Maki

(1995-ÖSS)

14. Aşağıdaki grafikte, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki aylık ortalama yağış miktarları gösterilmiştir.



Bu grafikte, □, ▨ ve ■ sırasıyla hangi bölgelerdeki yağış miktarını göstermektedir?

- | | □ | ▨ | ■ |
|---------------|------------|------------|---|
| A) İç Anadolu | Akdeniz | Karadeniz | |
| B) Akdeniz | İç Anadolu | Karadeniz | |
| C) Karadeniz | Akdeniz | İç Anadolu | |
| D) İç Anadolu | Karadeniz | Akdeniz | |
| E) Karadeniz | İç Anadolu | Akdeniz | |
- (1991-ÖSS)


15. Türkiye'de orman yangınları, Batı ve Güney kesimlerine göre Kuzey kesimlerinde çok daha azdır.

Kuzeyde orman yangınlarının az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orman içi yerleşmelerin dağınık olması
B) Orman alt sınırının kıyından başlaması
C) Nem oranının fazla olması
D) Ormanlarının daha çok yamaçlarda yer alması
E) Orman içi ulaşım ağının gelişmiş olması

(1991-ÖSS)

19. Aşağıda bir yerin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.




Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu yerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

- A) Kuzey Yarımkürede yer almaktadır.
B) Yıllık yağış miktarı 750 mm'nin üzerindedir.
C) Kar örtüsü ocak ayı boyunca yerde kalır.
D) En yağışlı mevsim kıştır.
E) En sıcak ay temmuzdur.

(1995-ÖSS)

20. Aşağıda bir yörenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.



Grafikten yararlanarak bu yöreyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez?

- A) Yıllık ortalama yağış tutarı
B) Yıllık ortalama sıcaklık değeri
C) Deniz seviyesinden yüksekliği
D) Hangi yarımkürede olduğu
E) Yağışın mevsimlere dağılışı

(1997-ÖSS)

21. İnsanlar tarafından ağaç kesilerek, yakılarak ormanların ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara "antropojen bozkır" denir. Buna göre, bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, o bölgedeki bozkırın antropojen olduğunun bir göstergesi olabilir?
- A) Toprakların tarıma elverişli olması
B) Farklı otsu bitki türlerinin olması
C) Yer yer orman ağacı topluluklarının görülmesi
D) Yerleşmelerin sık olması
E) Geniş düzlüklerin yer alması

(1997-ÖSS)

23. Orta kuşak okyanus iklimi her mevsimi yağışlı olan, yazın aşırı sıcakların, kışın aşırı soğukların görülmediği bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi bölümlerinden hangisinin kıyı kesiminde görülen iklim tipi orta kuşak okyanus iklimine benzer özellikler gösterir?
- A) Antalya Bölümü
B) Ergene Bölümü
C) Ege Bölümü
D) Adana Bölümü
E) Doğu Karadeniz Bölümü

(2001-ÖSS)

24. Türkiye'de, kurak geçen bir yıl içinde aşağıdakilerin hangisinde azalma olması beklenemez?
- A) Eklili - dikili alanların yüzölçümünde
B) Tarımsal üretim miktarında
C) Otlakların veriminde
D) Akarsu debilerinde
E) Taban suyu seviyelerinde

(2001-ÖSS)

26. X bölgesinin doğal bitki örtüsü maki, Y bölgesinin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bu durum, X ve Y bölgelerinin aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilir?
- A) Düzlik alanların oranı
B) Toprak türü
C) Uygulanan tarım yöntemleri
D) Yapılan hayvancılık türü
E) İklim tipi

(2006-ÖSS)

27. Türkiye'nin aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi bakı etkisiyle açıklanabilir?
- A) Orta Karadeniz Bölümü'nün yıllık ortalama yağış tutarının Batı Karadeniz Bölümü'nden az olması
B) Yazın en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanması
C) Akdeniz Bölgesi'nde maki üst sınırının Ege Bölgesi'nden daha yüksek olması
D) Ege Bölümü'nde yıllık ortalama sıcaklığın İç Batı Anadolu Bölümü'nden yüksek olması
E) Akdeniz Bölgesi'nde dağların kuzey yamaçlarında karın yerde kalma süresinin güney yamaçlarından uzun olması

(2006-ÖSS)

28. Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerde kayalarda genellikle kimyasal çözünme görülmektedir. Buna göre, kimyasal çözünmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde diğerlerinden daha çok olması beklenir?
- A) Antalya B) Konya C) Malatya
D) Tekirdağ E) Ankara


(2006-ÖSS)

29. Aşağıdakilerden hangisi, iki ayrı bölgenin benzer iklim özelliklerine sahip olduğunu gösteren en sağlam kanıttır?
- A) Birbirlerine komşu olmaları
B) Yüksekliklerinin aynı olması
C) Bitki örtülerinin aynı olması
D) Aynı enlemler arasında yer almaları
E) Aynı boylamlar arasında yer almaları

Kent	Yıllık sıcaklık Ortalaması (°C)	Yıllık yağış ortalaması (mm)
I.	18,6	1033
II.	17,5	693
III.	13,9	666

Yukarıda, üç kentimizin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış miktarları verilmiştir. Bu kentlerimiz, sırasıyla hangileridir?

- A) I. İstanbul B) I. İstanbul
II. İzmir II. Antalya
III. Antalya III. İzmir
C) I. İzmir D) I. İzmir
II. İstanbul II. Antalya
III. Antalya III. İstanbul
E) I. Antalya
II. İzmir
III. İstanbul



Yukarıda, aylık sıcaklık ve yağış ortalamaları grafikte gösterilmiş olan bir yörenin, doğal bitki örtüsü, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


- A) Çayır B) Orman C) Bozkır
D) Tundra E) Çöl

32. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin karakteristik bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Bozkır B) Savan C) Maki
D) Tundra E) Çayır

35. Toprağın derinliklerdeki kısmının yıl boyunca donmuş olarak kaldığı ve ancak yaz aylarındaki üst kısmının çözüldüğü bir bölgede ne tür bitki örtüsü görülür?
- A) Savan B) Step C) Tayga
D) Tundra E) Maki

37. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?
- A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi
B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi
C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması
D) Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi
E) Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi

(1990-ÖYS)



Yukarıdaki şekilde, iki bölgedeki bitki kuşaklarının yüksekliğe göre dağılışı gösterilmiştir.

I. bölgenin en alt kesiminde bozkırların yer alması aşağıdakilerden hangisinin sonucu olabilir?

- A) Deniz etkisine açık olması
B) Yaz sıcaklıklarının düşük olması
C) Buharlaşmanın az olması
D) Nem oranının düşük olması
E) Termik alçak basınç alanı olması

(1991-ÖYS)

43. İklim özellikleri benzer olan iki bölge arasında, başka bazı özellikler bakımından da benzerlik olması beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
- A) Doğal bitki örtüsü
B) Tarımsal etkinlik
C) Yer altı zenginliği
D) Akarsu rejimi
E) Konut tipi

(1993-ÖYS)


44. Türkiye'de çeşitli iklimlerin görülmesi aşağıdakilerden hangisini en az etkiler?
- A) Ulaşım hizmetlerini
B) Tarım ürünlerinin çeşitliliğini
C) Orman dağılışını
D) Toprak çeşitlerini
E) Akarsu uzunluklarını

(1994-ÖYS)

45. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede değişik iklim tiplerinin görüldüğünü kanıtlar?
- A) Akarsuların bol su taşıması
B) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
C) Bitki örtüsünün çeşitli olması
D) Endüstrinin yoğun olması
E) Erozyonun şiddetli olması

(1995-ÖYS)

47. Aşağıda, üç merkezin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir.



Bu grafiklerin her biri Zonguldak, İzmir ve Diyarbakır merkezlerinden hangisine aittir?

- | | I | II | III |
|---------------|------------|------------|-----|
| A) İzmir | Zonguldak | Diyarbakır | |
| B) Diyarbakır | İzmir | Zonguldak | |
| C) Zonguldak | Diyarbakır | İzmir | |
| D) Diyarbakır | Zonguldak | İzmir | |
| E) İzmir | Diyarbakır | Zonguldak | |

(1996-ÖYS)

48. Türkiye'nin ılıman kuşakta yer alması, aşağıdakilerden hangisini etkiler?

- A) Dağ sıralarının uzanışını
B) Ortalama yükseltisini
C) Bitki örtüsünü
D) Akarsularının boylarını
E) Saat dilimini

(1998-ÖYS)

50. Doğu Anadolu kışın Sibiryası antisiklonu etkisi altında girdiği zaman hava nasıl olur?

- A) Soğuk ve fırtınalı kar yağışlı
B) Hafif rüzgârlı, açık ve çok soğuk
C) Hafif rüzgârlı, soğuk ve kar yağışlı
D) Hafif rüzgârlı, soğuk ve bulutlu
E) Açık, soğuk ve fırtınalı

52. Bir kış günü, Türkiye Radyolarının günlük hava raporunda, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin Sibiryası antisiklonu altına girdiği bildirilmiştir. Bu bölgelerde hava nasıl olmuştur?

- A) Soğuklar ve rüzgârların şiddeti artmış, çok kar yağmıştır.
B) Soğuklar artmıştır, hava açık ve hafif rüzgârlıdır.
C) Soğuklar artmış, hava bulutlanmıştır.
D) Hava açılmış, rüzgârların şiddeti artmıştır.
E) Sıcaklık değişmemiş, rüzgârların şiddeti artmıştır.

53. Kars yöresinde en yağışlı dönem hangisidir?

- A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış
E) Sonbahar sonu - Kışbaşı


55. Aşağıdaki bitki cinsleri içinde hangisi maki bitki topluluğuna ait değildir?

- A) Defne
B) Mersin
C) Kocayemiş
D) Keçiboyunu
E) Fındık

56. Türkiye'de en kurak mevsimi yaz, en yağışlı mevsimi ilkbahar olan yağış rejimi, aşağıdaki rejim tiplerinden hangisidir?

- A) Akdeniz yağış rejimi
B) Karadeniz yağış rejimi
C) Kuzeydoğu Anadolu yağış rejimi
D) Marmara yağış rejimi
E) İç Anadolu yağış rejimi

60.



Yıllık yağışın mevsimlere dağılımını % olarak gösteren yukarıdaki grafikler, aşağıdaki yörelerden hangilerine aittir?

- | | I | II |
|---------------|----------|----|
| A) Rize | Edirne | |
| B) Kars | İstanbul | |
| C) Diyarbakır | Adana | |
| D) İzmir | Ankara | |
| E) Antalya | Samsun | |

CEVAPLAR

1. C	2. A	3. C	4. E	5. D	6. D
7. B	8. E	9. C	10. B	11. E	12. A
13. C	14. E	15. C	16. C	17. E	18. D
19. C	20. C	21. C	22. C	23. E	24. A
25. B	26. E	27. E	28. A	29. C	30. E
31. C	32. C	33. B	34. C	35. D	36. C
37. E	38. D	39. E	40. D	41. E	42. E
43. C	44. E	45. C	46. E	47. B	48. C
49. E	50. A	51. C	52. A	53. B	54. D
55. E	56. E	57. A	58. B	59. C	60. B

Bir bölgedeki yağış düzeninde meydana gelecek uzun süreli değişiklik, o bölgede aşağıdakilerin hangisini etkilemez?

- A) Tarım ürünleri çeşitliliği
B) Jeolojik yapı
C) Doğal bitki örtüsü
D) Mera hayvancılığı
E) Erozyon şiddeti

(1999-ÖSS)

Bir yerde güneş enerjisinden yararlanma olanağı güneşli gün sayısı ve güneşlenme süresine bağlı olarak değişir.


Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerden hangisinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı en azdır?

- A) Doğu Karadeniz kıyıları
B) Çukurova
C) Ege Bölgesi kıyıları
D) Konya Ovası
E) Harran Ovası

Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağların denize bakan yamaçlarından aşağı esen sıcak yerel rüzgârlar, aşağıdaki rüzgâr türlerinden hangisine benzer?

- A) Bora
B) İmbat
C) Mistral
D) Föhn
E) Karayel


Aşağıdaki haritada, Türkiye'de yıllık güneşlenme sürelerinin dağılışı gösterilmiştir.



Bu haritadaki bilgilerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

- A) Akdeniz Bölgesinin kıyı kesiminde güneşlenme süresi 3000 saatten fazladır.
B) Ege Bölgesinin kuzey ve güney kesimindeki güneşlenme süreleri arasındaki fark, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey ve güneyi arasındaki farktan azdır.
C) Marmara Bölgesinde güneşlenme süreleri ortalaması, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ortalamadan azdır.
D) Kıyı kesimleri boyunca güneşlenme süreleri birbirine yakındır.
E) Güneşlenme süresi Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe genellikle azalır.

(2001-ÖSS)



Yukarıdaki rüzgâr gülünde numaralanmış yönlerden esen rüzgârların adları, aşağıdaki-lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- | | I | II | III |
|--------------|-----------|-----------|-----|
| A) Karayel | Yıldız | Kesişleme | |
| B) Kesişleme | Karayel | Poyraz | |
| C) Yıldız | Kesişleme | Poyraz | |
| D) Kesişleme | Poyraz | Karayel | |
| E) Karayel | Poyraz | Kesişleme | |

(1994-ÖYS)

Şubat ayı sıcaklık ortalamaları °C olarak;

Niğde	Ankara	Merzifon	Samsun
0,7	1,0	2,6	6,9

Yukarıdaki verilere dayanarak sıcaklığın kuzeye gidildikçe yükseldiğini savunmak aşağıdakilerden hangisiyle çelişir?

- A) Matematik konum özellikleriyle
B) Özel konum özellikleriyle
C) Basınç merkezlerinin özellikleriyle
D) Yerçekillerinin özellikleriyle
E) Denizellik-karasallık özellikleriyle

Sıcaklık ortalamaları ile ilgili aşağıdaki sayısal bilgilerden hangisi Akdeniz iklimine aittir?

Yıllık	En soğuk ay	En sıcak ay
A) 11.4°	-0,9°	23°
B) 21.2°	12.3°	28.6°
C) 26.0°	25.4°	26.4°
D) 18.6°	10.0°	28.2°
E) -8.9°	-22,7°	4.6°

Kuzey Yarım Küre'de doğu-batı doğrultusunda uzanan dağların güney yamaçları genellikle yerleşme ve tarım için daha elverişlidir.

Bu duruma etki eden başlıca etmen aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bakı
- B) Ulaşım kolaylığı
- C) Su kaynaklarının bolluğu
- D) Denize yakınlık
- E) Bitki örtüsünün gürlüğü

Aşağıdakilerin hangisinde iklimin etkisi yoktur?


- A) Turizm etkinlikleri
- B) Akarsu rejimleri
- C) Gelgit olayı
- D) Doğal bitki örtüsünün dağılışı
- E) Erozyon

(1995-ÖYS)

960 m yükseklikte bulunan bir yerde sıcaklık 19 °C olduğunda, diğer koşullar eşit kabul edilirse, deniz kıyısındaki bir yerde sıcaklığın kaç derece olması beklenir?

- A) 9,4 B) 14,2 C) 16,6 D) 23,8 E) 28,6

(1992-ÖYS)



Yukarıdaki haritada, Türkiye'nin deniz seviyesine indirgenmiş yıllık izotermeleri gösterilmiştir.

Buna göre, en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu'da görülmesinde,

- I. Daha güneyde yer alma
- II. Deniz etkisine kapalı olma
- III. Nemli olma

etmenlerinden hangileri etkilidir?

- A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
- D) II ve III E) I, II ve III

(1991-ÖYS)

Kuzey Yarım Küre'de güneyden, Güney Yarım Küre'de ise kuzeyden esen rüzgârlar ılıtıcı etki yapar.

Bu durum, sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?

- A) Enlem B) Yerşekli C) Basınç
- D) Yükselti E) Bakı

(1990-ÖYS)

Türkiye'nin yıllık sıcaklık ortalamaları deniz seviyesine indirgenğinde, en yüksek sıcaklıkların güneyde değil, güneydoğuda olduğu görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


- A) Denize uzaklık
- B) Enlem derecesi
- C) Yer şekli
- D) Bitki örtüsü
- E) Buharlaşma miktarı

Yandaki grafikte, X ve Y kentlerinin aylık sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu grafikten çıkarılabilecek bir sonucu değildir?

- A) Yaz aylarında, Y'deki sıcaklık X'ten fazladır.
- B) Y'de en sıcak ay temmuzdur.
- C) Y'deki yıllık sıcaklık farkı X'ten fazladır.
- D) İki kent arasında sıcaklık farkının en fazla olduğu mevsim kışdır.
- E) X'te don olayı görülür, Y'de görülmez.

(1991-ÖYS)



Türkiye'nin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları incelendiğinde kuzeyi ile güneyi arasında yaklaşık 7-8 derecelik bir sıcaklık farkı bulunması ne ile açıklanabilir?

- A) Denizden uzaklık
- B) Yerşekli özellikleriyle
- C) Matematik konumu
- D) Yağış özellikleriyle
- E) Basınç merkezlerinin etkisiyle

(1986-ÖYS)

Yeryüzünün herhangi bir yerinde, yükseklerle çıkıldıkça bitki örtüsü kutuplara yaklaşıyor muş gibi değişikliğe uğrar.

Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi, bu genellemeye bir örnektir?

- A) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ormanların tahrip edilmesiyle makinelerin geniş yer kaplaması
- B) Kuzey Anadolu Dağları'nda 1000-1200 metreden sonra geniş yapraklı ormanların yerini iğne yapraklılara bırakması
- C) Akdeniz iklimine özgü bazı bitki türlerinin Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde de görülmesi
- D) Akdeniz ve Ege bölgelerinde tropikal bitkilerin yetişebilmesi
- E) Torosların kuzey ve güney yamaçlarında orman üst sınırının farklı olması

(2005-ÖSS)

Türkiye'nin indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık haritasından,

- I. ortalama yükselti,
- II. indirgenmiş en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki fark,
- III. mevsimler arasındaki sıcaklık farkı,
- IV. kıyıların gerçek yıllık ortalama sıcaklıkları

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?


- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
- D) II ve IV E) III ve IV

(2005-ÖSS)

Sonbaharda ekilen buğdayın Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde farklı zamanlarda olgunlaşması, sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?

- A) Denize yakınlık B) Yağış miktarı
- C) Toprak çeşidi D) Enlem
- E) Yükselti

Türkiye'de kıydan iç kesimlere doğru gidildikçe ve deniz seviyesinden yükseklerle çıkıldıkça yıllık ortalama sıcaklık değerleri değişir.




Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkı, yukarıdakilerden başka bir nedene dayanmaktadır?

- A) I ile VI B) II ile III C) II ile V
- D) III ile IV E) VI ile VII

(2004-ÖSS)

Aşağıdaki haritada gösterilen M noktasında yıllık sıcaklık ortalaması 17°C, N noktasında 9°C; P noktasında 18°C, R noktasında 15°C dir.




Bu noktalardan M ile N, P ile R arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkını oluşturan başlıca etkenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

- | M-N | P-R |
|-----------------|--------------|
| A) Bakı | Enlem |
| B) Bitki Örtüsü | Yükselti |
| C) Yükselti | Enlem |
| D) Yükselti | Bakı |
| E) Enlem | Bitki Örtüsü |

(1999-ÖSS)

Aşağıda, Türkiye'nin yıllık sıcaklık ortalamaları-na göre indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.



Bu haritayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) En düşük sıcaklıkla en yüksek sıcaklık arasındaki fark 8 °C den fazladır.
- B) En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu'dadır.
- C) Sıcaklık genelde güneyden kuzeye gittikçe azalmaktadır.
- D) Aynı enlem üzerindeki yerlerde sıcaklıklar birbirine eşittir.
- E) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'dadır.

(1998-ÖSS)

Kentler	Yıllık Ortalama Sıcaklık (°C)
İğdır	11,5
Erzurum	6,0
Ankara	11,6

Yukarıdaki tabloda üç kentin yıllık ortalama sıcaklıkları verilmiştir.

Aynı enlem üzerinde yer almalarına karşın Erzurum'un yıllık ortalama sıcaklığının İğdir ve Ankara'dan daha düşük olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Denize olan uzaklığının daha fazla olması
- B) Yükseltisinin daha fazla olması
- C) Daha fazla miktarda yağış alması
- D) Kuzey rüzgârlarına açık olması
- E) Bir ovada yer alması