



## TYT DENEME 2



1. Doğal afetler bir yerin iklim özellikleri, jeolojik ve jeomorfolojik yapısına göre değişir. Ülkemizin doğal özellikleri göz önüne alındığında yukarıdaki noktalarda görülebilecek doğal afetleri eşleştirdiğimizde hangisi yanlış olur?

- A) I – Deprem  
B) II – Orman Yangınları  
C) III – Heyelan  
D) IV – Erozyon  
E) V – Kuraklık



2. Bir hava kütesinin içindeki nem miktarına 'mutlak nem', hava kütesinin en fazla taşıyabileceği neme ise 'maksimum nem' denir. Bu ikisinin oranı yani bir havanın neme doyma oranı ise 'bağıl nem'

olarak adlandırılır. Aşağıdaki grafikte hava kütesinin günün belli saatlerindeki maksimum ve mutlak nem miktarları gösterilmiştir. Buna göre, hava kütesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olmaz?

- A) Sabah saatlerinde bağıl nem daha yüksektir.  
B) Nem açığının en fazla olduğu saat 13.00' tür.  
C) Havanın sıcaklığı arttıkça maksimum nem miktarı artmış, bağıl nem azalmıştır.  
D) Hava kütesinin nem taşıma kapasitesi sabah saatlerinde daha yüksektir.  
E) Sabahtan öğleye doğru yağış olasılığı azalmıştır.

3. 1998 yılında Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ı etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından, Devlet Başkanı Carlos Flores, "Başımıza gelen en büyük felaket bu. Köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkıldı. Elli yılda yavaş yavaş yapılanları, yetmiş iki saatte yitirdik," demiştir.

Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol açtığı,

- I. toprak II. ekonomi  
III. altyapı IV. nüfus

Kayıplarından hangilerine vurgu yapmıştır?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

4. Dünyanın eksen eğik olduğundan gündüz süreleri ekvator'dan kutba doğru değişir. Aşağıda 21 Haziran tarihine ait bazı merkezlerdeki gündüz süresi verilmiştir.

- A - 16 saat  
B - 12 saat  
C - 6 saat  
D - 8 saat

Bu merkezler için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

- A) C Güney yarımkürede yer alır.  
B) B merkezi yıl boyunca güneş ışınlarını dik açıyla alır.  
C) A merkezi kuzey kutup noktasına en yakındır.  
D) A ve D'nin enlem dereceleri aynıdır.  
E) Gece gündüz süre değişimi en az B merkezindedir.

www.tekinkhaca.com

I. Kısa boylu mevsimlik otlardır. İlkbaharda yeşerir yazın kurur. Genellikle denizden uzak iç bölgelerde görülür.

II. Her mevsim yeşil kalan defne, zeytin gibi kısa boylu ağaçlardan oluşan bitki örtüsüdür. Yaz kuraklığına dayanıklıdır, kış soğuklarını sevmez.

III. Sıcak kuşakta yaz yağışlarıyla büyüyen yüksek boylu ot topluluklarıdır. Aslan, kaplan, antilop gibi yabani hayvan sürüleri bu ot topluluğunun olduğu yerlerde yaşarlar.

IV. Bitki yönünden fakirdir. Nadiren kurakçıl bitkiler görülür. Bu bitkilerin kök sistemleri gelişmiş olup toprağın derinliklerindeki nemi alabilirler.

5. Yukarıda dört farklı iklim tipinin karakteristik bitki örtüsü hakkında bilgi verilmiştir. Hangi iklim tipinin karakteristik bitki örtüsü hakkında bilgi yoktur?

- A) Okyanusal iklim  
B) Savan (Subtropikal) iklim  
C) Akdeniz iklimi  
D) Çöl iklimi  
E) Ilıman karasal (Bozkır) iklim

CEVAPLAR: 1A 2D 3C 4B 5A